



راهنمای جمع آوری نمونه خون مخفی (OB)

شرایطی که رعایت آن‌ها موجب بدست آمدن جواب آزمایش با دقت و صحت بالا می‌شود:

- ✓ خانم‌هایی که عادت ماهیانه هستند سه روز بعد از پایان دوره ماهیانه نمونه بدهند.
- ✓ چنانچه بیمار به بواسیر یا شقاق مقعد مبتلا است و خونریزی واضحی از این ضایعات مشاهده می‌گردد قبل از انجام آزمایش به آزمایشگاه اطلاع دهد.
- ✓ چنانچه بیمار به علل مختلف دچار خونریزی از لثه یا مخاط دهان است بلع خون از این ناحیه سبب مثبت شدن کاذب می‌شود.
- ✓ حداقل از 7 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف داروهای سالیسیلات مانند آسپیرین سایر داروهای ضد التهابی مثل ایبوپروفن، ناپروکسن، ایندومتاسین، دیکلوفناک سدیم، کلشی سین، ویتامین سی، آنتی اسیدها، ترکیبات آهن دار و یددار، دیورتیک های تیازیدی و رزرپین اجتناب گردد. در غیر این صورت به آزمایشگاه اطلاع داده شود.
- ✓ نمونه مدفوع باید در ظرف پلاستیکی که از طرف آزمایشگاه در اختیار مراجعین قرار می‌گیرد جمع آوری شود.
- ✓ نمونه مدفوع نباید با کلنکس، صابون، ادرار یا آب مخلوط شود.
- ✓ نمونه‌های مشکوک به اسهال خونی باید بلافاصله به آزمایشگاه ارسال گردد.
- ✓ از سه روز قبل از گرفتن نمونه از مصرف قرص آهن، گوشت قرمز، شلغم، گل کلم، کلم، بروکلی، ترب، قارچ، سیب، تربچه، پرتقال، موز، طالبی، خربزه، هندوانه، انگور، آنتی اکسیدان، آسپیرین، ویتامین C خودداری کنید.
- ✓ هفت روز قبل و در دوره جمع آوری نمونه از مصرف الکل اجتناب کنید.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی



راهنمای جمع آوری نمونه مدفوع

شرایطی که رعایت آن‌ها موجب بدست آمدن جواب آزمایش با دقت و صحت بالا می‌شود:

- ✓ خانم هایی که عادت ماهیانه هستند سه روز بعد از پایان دوره ماهیانه نمونه بدهند.
- ✓ در مواردی که اندازه گیری چربی در مدفوع مورد درخواست می باشد، بیمار نباید پیش از جمع آوری نمونه از شیاف یا مواد روغنی استفاده نماید.
- ✓ 4 تا 5 روز پیش از نمونه دادن از درمان با روغن‌های کرچک یا روغن‌های معدنی، بیسموت، منیزیوم، ترکیبات ضد اسهال، تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک‌ها خودداری نمائید (مگر به دستور پزشک معالج).
- ✓ نمونه مدفوع باید در ظرف پلاستیکی که از طرف آزمایشگاه در اختیار مراجعین قرار می گیرد جمع آوری شود.
- ✓ نمونه مدفوع نباید با کلنکس، صابون، ادرار یا آب مخلوط شود.
- ✓ نمونه‌های مشکوک به اسهال خونی باید بلافاصله به آزمایشگاه ارسال گردد.
- ✓ در آزمایشات سه نوبته هر نوبت در یک روز یا یک روز در میان انجام شود و اگر فرد دچار یبوست باشد سه نمونه را باید حداکثر در فاصله زمانی 10 روز جمع آوری کند.
- ✓ اگر احتمالاً ظرف حاوی مایع نگهدارنده می‌باشد (فرمالین 10٪) از دست زدن یا دور ریختن آن خودداری نمائید زیرا این مایع نگهدارنده تخم انگل‌ها و تک یاخته‌های روده ای است.