



آمادگی مورد نیاز جهت تست UBT

شرایط ویژه بیمار و وضعیت بالینی:

1. خانم حامله در طول دوران بارداری نباید این تست را انجام دهد.
2. باید 6 ساعت ناشتایی رعایت شود (عدم مصرف مایعات و مواد غذایی).
3. عدم مصرف آنتی بیوتیک (به جز ونکومايسين، نالی دیکسیک اسید، آموترپیسین B و تری متوپریم) و ترکیبات بیسموت 1 ماه قبل از انجام تست (مگر به دستور پزشک).
4. عدم مصرف آنتی اسید در 5 روز گذشته (مگر به دستور پزشک).
5. مسواک زدن و شستشوی دهان قبل از انجام آزمایش الزامی است.
6. چنانچه بیمار دندان مصنوعی دارد قبل از خوردن محلول از دهان خارج سازد.
7. عدم مصرف امپرازول از 14 روز قبل از تست (سبب منفی کاذب می شود).
8. عدم مصرف سایمتیدین، رانیتیدین، فاموتیدین، 24 ساعت قبل از انجام تست.

نحوه انجام تست:

1. کپسولی را که به شما داده می شود با حدود 50 سی سی آب (تقریباً 1/3 لیوان یکبار مصرف) میل نمایید.
2. 15 دقیقه بعد از خوردن دارو به صورت نشسته در کیسه ای (Bag) که به شما داده می شود به صورت تنفس از بینی و بازدم (فوت کردن) از دهان بدمید و این کار را به آرامی انجام دهید تا رنگ کاغذ معرف نصب شده در روی کیسه از نارنجی به زرد تبدیل گردد.
- ❖ در حین انجام تست حتماً جهت تنفس (پر کردن هوا در ریه یا عمل دم) کیسه را از دهان بردارید.
3. کیسه را به پرسنل بخش نمونه گیری تحویل دهید